

①三種混合、四種混合、麻しん風しん混合、BCG、不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの個別接種

予防接種の種類及び対象月例	<p>【三種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風）】</p> <p>○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月）</p> <p>注：いずれか1疾病もしくは2疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。</p> <p>※三種混合ワクチン同士の接種間隔は以下記載の「接種間隔」をご覧ください。</p> <p>【四種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）】</p> <p>○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月）</p> <p>※四種混合ワクチン同士の接種間隔は以下記載の「接種間隔」をご覧ください。</p> <p>※これまでに三種混合ワクチン及びポリオワクチンの接種をいずれも行っていない児童が対象。いずれかを接種している場合は、三種混合ワクチン・不活化ポリオワクチンの接種を行う</p> <p>【麻しん風しん混合ワクチン第1期】</p> <p>○対象～12ヶ月以上24ヶ月未満（期間内1回接種）</p> <p>○条件～麻しんワクチン及び風しんワクチンをどちらも接種していない方</p> <p>注：いずれか1疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。</p> <p>例～麻しんに罹った方も「麻しん風しん混合ワクチン」の接種対象となります。</p> <p>【麻しん風しん混合ワクチン第2期】</p> <p>○対象～60ヶ月（5歳）以上84ヶ月（7歳）未満（期間内1回接種）</p> <p>※小学校就学前の1年間</p> <p>○条件～下記①～③のいずれかに該当する方</p> <p>①過去に麻しんワクチン及び風しんワクチンをどちらも接種していない方</p> <p>②過去に麻しんワクチン及び風しんワクチンを両方とも接種している方</p> <p>③過去に麻しんワクチンまたは風しんワクチンのどちらか1つを接種している方</p> <p>注：いずれか1疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。</p> <p>【BCGワクチン】</p> <p>○対象～1歳未満（標準接種期間は5ヵ月以上8ヶ月未満）（期間内1回接種）</p> <p>【不活化ポリオワクチン】</p> <p>○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月）</p> <p>ポリオワクチンと三種混合ワクチンが未接種の方は、原則として四種混合ワクチンを接種しますが、単独の不活化ポリオワクチンと三種混合ワクチンを選択することも可能です。</p> <p>【ヒブワクチン】</p> <p>○対象～生後2ヶ月以上5歳未満</p> <p>※接種開始月齢によって接種回数異なります。</p> <p>①接種開始月齢が2ヶ月以上7ヶ月未満</p> <p>初回免疫：4～8週間の間隔をあけて3回接種</p> <p>追加免疫：初回免疫終了後、7ヶ月～13ヶ月の間に1回接種</p> <p>②接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満</p>
---------------	---



	<p>初回免疫：4～8週間の間隔をあけて2回接種</p> <p>追加免疫：初回免疫終了後、7ヶ月～13ヶ月の間に1回接種</p> <p>③接種開始月齢が生後12ヶ月以上5歳未満 1回の接種のみ</p> <p>【小児用肺炎球菌ワクチン】</p> <p>○対象～生後2ヶ月以上5歳未満</p> <p>※接種開始月齢によって接種回数異なります。</p> <p>①接種開始月齢が2ヶ月以上7ヶ月未満</p> <p>初回免疫：4週（27日）以上の間隔をあけて3回接種</p> <p>※3回目の接種は1歳未満までに終了する。</p> <p>追加免疫：初回免疫終了後60日以上の間隔をあけて1回接種</p> <p>※追加接種は、おおむね1歳以上1歳3ヶ月の間に接種</p> <p>②接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満</p> <p>初回免疫：4週（27日）以上の間隔をあけて2回接種</p> <p>追加免疫：初回免疫終了後60日以上の間隔をあけて1回接種</p> <p>※追加接種は、おおむね1歳以降に接種</p> <p>③接種開始月齢が12ヶ月以上24ヶ月未満</p> <p>60日以上の間隔をあけて2回接種</p> <p>④接種開始月齢が24ヶ月以上5歳未満 1回のみ接種</p>
接種間隔	<p>☆27日以上あけるもの（生ワクチン）～BCG・麻しん風しん混合・水痘おたふくかぜなど</p> <p>◆これらを接種した場合は、次の予防接種までの間隔を必ず27日以上あけましょう。（接種した次の日から数え、まる27日間あける）</p> <p>例～1日にBCGを受けた場合、29日から接種可能です。</p> <p>☆6日以上あけるもの（不活化ワクチン）～三種混合・四種混合・不活化ポリオ・ヒブ・小児用肺炎球菌・インフルエンザワクチン</p> <p>◆これらを接種した場合は、次の予防接種までの間隔を必ず6日以上あけましょう。但し、三種混合・四種混合・ポリオワクチンの第1期初回接種（最初の3回）は20日～56日の間隔をあけて接種しましょう。また、第1期の追加接種（4回目）は1期の3回目を接種した後、12ヶ月以上18ヶ月の間で接種しましょう。なお、発熱等の予防接種不适当要因により、第1期初回接種（最初の3回）を20日～56日の間隔で接種できない方については、その要因が解消された後、すみやかに受けましょう。</p>
接種場所	興部町国民健康保険病院（会計窓口にて受付）
日程及び受付時間	<p>○受付時間 15:30～16:30</p> <p>（受付後、診察・接種までお待ち頂く場合もありますので、予めご了承ください。）</p> <p>○実施日及び対象予防接種（祝祭日は除く）</p> <p>毎週水曜日～三種混合・四種混合・不活化ポリオ・ヒブと小児用肺炎球菌ワクチンについては同時接種または単独接種</p> <p>毎週木曜日～麻しん風しん混合・小児用肺炎球菌ワクチンについては単独接種のみ</p>

