令和6年度　興部町　乳幼児予防接種表

令和6年4月～

【 定 期 接 種 】

※定期接種は費用の自己負担はありませんが、対象月齢を過ぎた場合は任意接種(接種費用自己負担)となります。

ワクチン	対象月齢		接種回数
ロタウイルス（1価） 経口生ワクチン	生後6週0日以後～24週0日までに完了 **（初回接種は標準的には 2か月～14週6日までに完了）**		2回　：４週以上の間隔をあけて2回接種 **※1回目の接種は生後14週6日までに完了すること。過ぎた場合は接種できません。**
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	２か月以上 ５歳未満	接種開始月例が ２か月以上７か月未満	初回免疫　：４週以上の間隔をあけて３回接種 ※３回目の接種は１歳未満までに完了する 追加免疫　：初回免疫終了後６０日以上の間隔をあけて１回接種 ※追加接種は、１歳以上１歳３か月の間に接種
B型肝炎 不活化ワクチン	１歳に至るまでの間 **（標準接種期間は2か月以上9か月未満）**		初回免疫:生後２か月から、４週(27日)以上の間隔をあけて２回接種 追加免疫:**1回目の接種から20週（139日）以上の間隔をあけて**1回接種
五種混合 不活化ワクチン	第１期初回 ２か月以上９０か月（７歳６か月）未満		３回 それぞれ３～８週（２０日～５６日）の間隔をあけて接種
	第１期追加 ２か月以上９０か月（７歳６か月）未満		１回 初回接種終了後６か月以上の間隔をあけて接種 **（標準的接種期間は 初回接種終了後12～18か月の間）**
BCG 注射生ワクチン	１歳未満 **（標準接種期間は5か月以上8か月未満）**		１回
麻しん風しん混合(MR) 注射生ワクチン	第１期 １２か月（１歳）以上２４か月（２歳)未満		１回
	第２期 ５歳以上７歳未満（小学校就学前１年間）		１回
水痘 注射生ワクチン	１２か月（１歳）以上３６か月（３歳)未満		２回　※罹患歴がある方は接種不要 初回接種終了後３か月以上（標準的には６か月～１２か月）あけて２回目を接種
日本脳炎 不活化ワクチン	第1期初回 ６か月以上９０か月（７歳６ヶ月）未満 **（標準接種期間は3歳以上4歳未満）**		２回 6日以上（標準的には６日～２８日）あけて接種
	第１期追加 ６か月以上９０か月（７歳６ヶ月）未満 **（標準接種期間は4歳以上5歳未満）**		１回 初回接種終了後６か月以上（標準的にはおおむね1年）あけて接種
	第２期 ９歳以上１３歳未満 **（標準接種期間は9歳以上10歳未満）**		１回
おたふく（任意接種） 注射生ワクチン	第1期 1歳以上 **（推奨接種期間は1歳以上2歳未満）** 第2期(※右記参照) **（推奨接種期間は小学校入学前　5歳以上7歳未満）**		1～2回 ※2回目接種については、日本小児科学会が推奨しているものです。 ※推奨接種間隔より短くなる場合の接種の是非については、特に提唱がされていないため、各ご家庭・医師の判断となります。



＊裏面には「予防接種の受け方」「注意事項」等を記載していますので、ご覧ください＊

予防接種の受け方について

✿　**接種場所：　興部町国民健康保険病院**

※上記以外の医療機関で接種された場合は自己負担が生じる可能性がありますのでご注意ください。

※アレルギー等の理由により小児科医のもとで接種する必要があると診断された場合や、長期里帰り等により町外の医療機関で接種する必要がある場合等は、**健康推進係までご連絡ください。**

✿　**接種実施日時：毎週月曜日　小学生未満　13:30～15:30（土日祝日は除く）**
小学生以上　15:30～16:30（土日祝日は除く）

✿　**接種予約**：接種を希望する前の週の月曜日までに、**国保病院（82－2310）への予約が必要です。**

＜委任状の提出について＞

予防接種法に基づく定期予防接種については、原則、保護者の同伴が必要です。
やむを得ない理由で同伴できない場合は、予防接種を受けるお子様の健康状態を把握している保護者以外の方（祖父母・成人している兄弟など）が同伴し接種を受けることができます。この場合、**【委任状の提出】**が必要です。必要な方は、**健康推進係までご連絡ください。**

予防接種についての注意事項！

【接種間隔について】　　～接種予約前に必ず確認しましょう～

★ **生ワクチン（注射）を接種後、次に生ワクチン（注射）を接種する場合は27日（4週間）以上あける。**
※それ以外のワクチンの組み合わせにおいては、接種間隔に制限はありません。

★ **同じ種類のワクチンを接種する場合は、定められた間隔をあける。**

注）接種間隔の起算は
接種した翌日を１日目として数えます。

疾患罹患後のワクチン接種について

ワクチン接種による十分な免疫の獲得と接種後の副反応を防ぐために、ウイルス性疾患（麻しん・風しん・水ぼうそう・おたふく・突発性発疹等）に罹患した場合は、全身状態が十分に改善されてから接種しましょう。
いずれも治癒後、２～4週間あけて接種することが望ましいとされています。

同時接種について

原則、４種類までどのワクチンとの組み合わせでも同時接種することができます。
※ただし、BCGは単独接種となります。

任意接種のワクチンについて

任意接種ワクチンの接種医療機関に指定はありません。接種を希望される医療機関へお問合せください。

✿おたふくかぜワクチン…興部町国保病院にて接種される場合は、【無料】で接種できます。※罹患歴がある方は接種不要

連絡先

◆ 接種の予約、予約の変更について　　**興部町国民健康保険病院　82－2310**
◆ 接種内容や接種時期の相談、その他お問い合わせ　　**きらり　健康推進係　保健師　82－4170**

標準的な接種スケジュール ※あくまでも参考です。

生後６週間以降
ロタウイルス①

→ **2～3か月頃**
ロタウイルス②
肺炎球菌①
Ｂ型肝炎①

→ **3～4か月頃**
肺炎球菌②
Ｂ型肝炎②
五種混合②

→ **4～5か月頃**
肺炎球菌③
五種混合③

→ **6～8か月頃**
Ｂ型肝炎③
BCG

→

1歳頃
肺炎球菌 追加
ＭＲ 1期

→ **1歳半頃**
五種混合 追加
水痘②

→ **3歳頃**
日本脳炎

→ **3歳1ヶ月頃**
日本脳炎

→ **4歳頃**
日本脳炎

→

小学校就学前（年長児）
麻しん風しん２期

→ **9歳0か月～**
日本脳炎２期

接種スケジュールについて
不明な点は、お気軽に
ご相談ください♪